

Sagen Sie es durch die Blume!



M promo seed packs Gr. M
(Größe 87,09 x 127 mm)



Sonnenblume (Helianthus annuus)
Aussaart: April-Juni im Garten mit einem Abstand von 50 cm, sonniger Standort. Während der Keimung stets feucht halten. Blüte: Je nach Aussaat Juli-Oktober.



Marguerite (Leucanthemum vulgare)
Aussaart: Mai-Juli im Garten. Saat leicht andrücken. Sonniger bis halbschattiger Standort. Während der Keimung stets feucht halten. Blüte: Je nach Aussaat Juni-September



Kornblume (Centaurea cyanus)
Aussaart: April-Ende Mai im Garten, breitflächig oder in Reihen. Sonniger bis halbschattiger Standort. Während der Keimung stets feucht halten. Blüte: Je nach Aussaat Juni-August.



Bienenfreund (Phacelia tanacetifolia)
Aussaart: Ende April bis September direkt im Beet oder Topf, sonniger bis halbschattiger Standort. Während der Keimung stets feucht halten. Keimdauer: 7-14 Tage bei 12-18°C. Blüte: je nach Aussaatzeitpunkt ab ca. Juni bis zum Frost.



Ringelblume (Calendula officinalis)
Aussaart: Ende März-Mitte Juni im Garten, breitwürfig oder in Reihen. Saat leicht andrücken. Während der Keimung stets feucht halten. Blüte: Je nach Aussaat Juni-Oktober.



Wiesenklee (Trifolium repens)
Aussaart: Im Haus ganzjährig möglich, im Garten von April - Juli flächig aussäen. Sonniger Standort. Während der Keimung stets feucht halten. Blüte je nach Aussaat von Mai - September.



Vergissmeinnicht (Myosotis alpestris)
Aussaart: Juni-September in einem geschützten, schattigen Saatbeet im Garten. Saat leicht andrücken. Während der Keimung stets feucht halten. Blüte: April-Juni.



Schmuckkübchen (Cosmos bipinnatus Mix)
Aussaart: Mitte April-Ende Mai im Garten. Saat leicht andrücken. Sonniger Standort. Während der Keimung stets feucht halten. Blüte: Je nach Aussaat Juni-September.



Zinnie (Zinnia elegans Mix)
Aussaart: Mai-Ende Juni im Garten. Sonniger, geschützter Standort. Während der Keimung stets feucht halten. Blüte: Je nach Aussaat Juli-Oktober.



Bienenblumenmischung
Aussaart: April-Juni breitflächig im Garten, sonniger Standort. Während der Keimung stets feucht halten. Blüte: Je nach Sorte und Aussaat Juli-Oktober.



Wildblumenmischung
Aussaart: Ende März-Mitte Juni breitflächig im Garten. Während der Keimung stets feucht halten. Blüte: Je nach Sorte und Aussaat Juni-Oktober.



Rotfichte (Picea abies)
Aussaart: Saat 24 Std. im Wasser quellen lassen, locker im Topf aussäen und mit 0,5 cm Erde bedecken. Stets feucht halten. Bei ca. 12 cm Größe vereinzeln.

Wählen Sie Ihre Saat!

Mit der passenden Saat verstärken Sie Ihre Werbebotschaft.



XL promo seed packs Gr. XL
(Größe 101,6 x 152,5 mm)



Kopfsalat (Lactuca sativa)
Aussaart: März-Juni im Garten in Reihen. Saat leicht andrücken. Sonniger bis halbschattiger Standort. Während der Keimung stets feucht halten.



Radieschen (Raphanus sativus)
Aussaart: März-August im Garten in Reihen. Dünn aussäen. Sonniger Standort. Während der Keimung stets feucht halten.



Möhren (Daucus carota)
Aussaart: März-Juli im Garten in Reihen. Sonniger Standort. Während der Keimung stets feucht halten.



Spinat (Spinacia oleracea)
Aussaart: März-April und August-September im Garten in Reihen. Sonniger Standort. Während der Keimung stets feucht halten.



Tomate (Solanum lycopersicum)
Aussaart: Ab Mai im Garten, sonniger Standort. Dünn aussäen und stets feucht halten. Pflänzchen mit einem Stab stützen. Nebentriebe regelmäßig ausgeizen. Während der Keimung stets feucht halten.



Chili (Capsicum annuum)
Aussaart: Im Haus ganzjährig möglich, im Garten ab Mai. Keimtemperatur ca. 22°C. Sonniger Standort. Während der Keimung stets feucht halten. Pflänzchen mit einem Stab stützen.

Hinweis: Weitere Saaten auf Anfrage



Kresse (Lepidium sativum)
Aussaart: Im Haus ganzjährig möglich, im Garten von April-Oktober. Sonniger bis halbschattiger Standort. Saat nicht mit Erde bedecken und immer feucht halten.



Basilikum (Ocimum basilicum)
Aussaart: Im Haus ganzjährig möglich, im Garten ab Mai-September, sonniger Standort. Saat leicht andrücken und während der Keimung stets feucht halten.



Schnittlauch (Allium schoenoprasum feinröhrig)
Aussaart: Im Haus ganzjährig möglich bei Temp. unter 18°C. Im Garten von Mitte März-August, halbschattiger Standort. Während der Keimung stets feucht halten.



Petersilie, glatt (Petroselinum crispum)
Aussaart: Saat einige Stunden quellen lassen, dann erst aussäen. Im Haus ganzjährig möglich, im Garten ab April-August, halbschattiger Standort. Während der Keimung stets feucht halten.



Dill (Anethum graveolens)
Aussaart: April-Juli im Garten, sonniger Standort. Saat leicht andrücken und während der Keimung stets feucht halten.



Zitronenmelisse (Melissa officinalis)
Aussaart: Im Haus ganzjährig möglich, im Garten von April-Juni. Saat leicht andrücken. Sonniger bis halbschattiger Standort. Während der Keimung stets feucht halten.